

Geneesmiddel-provocatietest volwassenen

ALLERGOLOGIE

Patiënteninformatie

Binnenkort wordt u in onze kliniek verwacht voor een provocatietest met een geneesmiddel. Tijdens deze test kan worden vastgesteld of u allergisch bent voor het geteste geneesmiddel.

Wat is een geneesmiddelprovocatietest?

Een geneesmiddelprovocatietest is een onderzoek waarbij u in een aantal stappen in toenemende dosering een geneesmiddel toegediend krijgt door middel van het slikken of inspuiten van een geneesmiddel. Het doel van deze test is om vast te stellen of u allergisch bent voor een bepaald geneesmiddel.

Duur van de test

De provocatietest vindt meestal plaats door middel van zo'n 3 tot 4 stappen, te beginnen met een kleine hoeveelheid waarbij er na elke stap een hogere dosering geneesmiddel wordt gegeven. Na elke stap wordt een uur gewacht (een enkele keer is de wachttijd een half uur) om te observeren of u klachten krijgt, voordat verdergegaan wordt naar de volgende stap. Na de laatste stap wordt u nog minimaal een uur geobserveerd. De provocatietest zal meestal 3- 4 uur duren, maar houdt er rekening mee dat u de hele dag hieraan kwijt bent.

Verloop van de test

Tijdens de geneesmiddelprovocatie is het mogelijk dat u een allergische reactie krijgt. Om die reden vindt de provocatietest plaats middels een dagopname onder klinische bewaking (zodat bloeddruk, hartslag e.d. gemeten kunnen worden) en wordt er zo nodig een infuus/waaknaald ingebracht. Mocht er sprake zijn van een allergische reactie dan wordt de provocatietest gestopt en dan wordt deze reactie behandeld met medicatie. U blijft ter observatie tot de klachten weer (voldoende) hersteld zijn. De kans dat u daarna thuis nog een reactie krijgt is minimaal.

Vorbereiding

Afmelden:

- Mocht u om wat voor redenen onverhoopt verhinderd zijn, verzoeken wij u zo snel mogelijk te bellen om, zodat wij mogelijk nog een andere patiënt in uw plaats kunnen laten komen.
- In geval van koorts, griep, ernstige verkoudheid of (ernstige) astmaklachten kan de test niet doorgaan.
- Zwangerschap: vanwege het mogelijke risico voor moeder en kind worden geen provocatie verricht bij zwangere vrouwen.

Medicatie:

- U mag 72 uur voorafgaand aan de provocatietest geen antihistaminica (bv. levocetirizine, cetirizine, loratadine, desloratadine, fexofenadine) gebruiken. Deze medicijnen kunnen de test verstoren.
- Neussprays, oogdruppels en zalven kunt u blijven gebruiken.
- Inhalatiemedicijnen voor astma kunt u in principe gewoon doorgebruiken, tenzij anders afgesproken met uw behandelend arts.
- Bent u medicatie gaan gebruiken die niet bij ons bekend is (bv. prednisolon) neem dan contact op met ons.

Eten en drinken

Tijdens een provocatietest met een geneesmiddel mag u gewoon eten en drinken. U mag de afdeling niet verlaten. Wij raden u daarom aan om iets te eten en te drinken mee te nemen.

Vervoer naar huis

Zorg ervoor dat u na de provocatietest niet zelf naar huis hoeft te rijden. Dit wegens mogelijke bijwerkingen van slaperigheid, vermoeidheid of concentratiestoornissen van de medicatie die wij eventueel toe moeten dienen in het geval van een allergische reactie. Daarnaast kunt u van de allergische reactie zelf ook vermoeid raken. Dit beïnvloedt het reactievermogen tijdens deelname in het verkeer, daarom is het veiliger om niet zelf naar huis te moeten rijden.

Wat neemt u mee?

- iets om 'de tijd te doden' (zoals iets te lezen) gezien de test in elk geval een ochtend en soms de hele dag in beslag neemt.
- iets te eten en/of te drinken tijdens / na de geneesmiddelprovocatietest.

Uitslag

Na afloop van de provocatie krijgt u een afspraak bij uw arts om de resultaten van de provocatietest te bespreken.

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Laat daarom uw waardering achter op ZorgkaartNederland.nl!



**Zorgkaart
Nederland**

Patiëntenfederatie Nederland

Wilt u een
waardering
achterlaten?