

Blokkade ganglion C2

Patiënteninformatie

PIJNZORG

Bij hoofdpijn kan de zenuwwortel van de tweede nekwervel verantwoordelijk zijn voor de klachten. Er is een behandeling van deze zenuw mogelijk om de klachten te verminderen. Deze behandeling houdt in dat een naald, onder röntgendoorlichting, bij een zenuw wordt geplaatst. Met een bepaald soort stroom wordt via deze naald de zenuw behandeld, waardoor een langdurig pijnstillend effect kan optreden.

Vorbereiding

Overleg in de volgende gevallen vóór de behandeling met uw pijnspecialist:

- u gebruikt bloedverdünnende medicijnen;
- u heeft suikerziekte;
- u bent mogelijk zwanger;
- u bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters.

De dag van de behandeling

Zorg dat u op tijd aanwezig bent (minimaal 10 minuten voor uw afspraak). U kunt zich melden bij de receptie. U neemt, eventueel met uw begeleider, plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen kan de begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.

De behandeling

U gaat op een smalle tafel liggen. De naald wordt onder röntgendoorlichting geplaatst bij de zenuw. Hierna geven we de behandeling via de naald aan de zenuw. Dit hoort niet pijnlijk te zijn, maar als het onaangenaam is kan de zenuw worden verdoofd.

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u in de avond verwijderen. U kunt de volgende dag weer douchen en baden. Na de behandeling wordt u op een bed op de dagklinik gelegd en krijgt u na enige controles een vervolgspraak mee.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na enkele weken tot wel 2 maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De behandeling van een zenuwwortel leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen optreden na een behandeling van een zenuwwortel:

- een bloedingstorting kan ontstaan als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken. Dit veroorzaakt soms pijn;
- spierpijn op de plaats van de behandeling, dit is van tijdelijke aard.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur (vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.

Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad of kijk op www.dcklinieken.nl.



DC Klinieken