

Pijnbehandeling met behulp van echo



Patiënteninformatie

Echo(grafie) is een onderzoek waarbij met behulp van hoogfrequente geluidsgolven een beeld wordt gemaakt van onderliggende structuren zoals bloedvaten en zenuwen. Deze geluidsgolven hebben een hoge frequentie waardoor ze niet hoorbaar zijn. Deze geluidsgolven zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Deze geluidsgolven worden via een 'echokop' aan de huid afgegeven, als deze op de huid geplaatst wordt. De geluidsgolven worden door het betreffende deel van het lichaam weerkaatst en weer opgevangen door de echokop. Deze informatie wordt in beeld omgezet op het echo apparaat, waardoor spieren, bloedvaten en zenuwen zichtbaar worden en gebruikt kan worden bij behandelingen.

De dag van de behandeling

De behandeling vindt plaats in het pijncentrum. U kunt zich melden bij de receptie. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U neemt, met uw begeleider, plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent wordt u naar de behandelkamer gebracht.

De behandeling

Indien u een behandeling krijgt waarbij het echoapparaat gebruikt wordt betreft dit vaak een behandeling van een zenuw. Met behulp van het echoapparaat wordt het gebied waar de zenuw loopt in beeld gebracht. De naald wordt geplaatst onder zicht van de echo. In overleg met uw behandelend specialist kan er dan het volgende worden gedaan:

- injectie van medicijnen (verdoovingsmiddel en/of ontstekingsremmend middel)
- behandeling van de zenuw met behulp van PRF-stroom
- een combinatie van deze twee

Voorzorgsmaatregelen

Indien een van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u contact op te nemen met ons:

- Gebruik van bloed verdunnende medicatie
- (mogelijke) Zwangerschap
- Allergisch of overgevoelig voor: contrastmiddel, jodium, bepaalde medicijnen, pleisters

Complicatie/bijwerkingen

De volgende complicaties/bijwerkingen kunnen na de behandeling optreden:

- Tijdens de procedure kan er een bloedvat geraakt worden. Soms treedt er dan een bloeding op en kan dit pijnklachten veroorzaken
- Napijn na de behandeling. Dit kan enkele dagen tot twee weken aanhouden
- Bij achterlaten van ontstekingsremmend medicijn:
 - Bloedsuiker waarden kunnen schommelen
 - Opvliegers (bij vrouwen)
 - Verstoorde menstruatie
 - De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar
- Tijdelijk verdoofd gevoel van het behandelde gebied

Na de behandeling

Bij napijn van de behandeling kunt u eventueel (extra) pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens de bijsluiter). Op de prikplek wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. Pas na enkele weken kan het effect van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter ook mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.



DC Klinieken

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur (vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.

Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad of kijk op www.dcklinieken.nl.



DC Klinieken