

Infiltratie van een gewricht

PIJNZORG

Patiënteninformatie

De infiltratie van een gewricht betekent dat er ontstekingsremmende of pijnstillende medicatie wordt ingebracht in het gewricht. In sommige gevallen maken wij ook gebruik van een medicijn dat het gewricht versoepelt. Bij de infiltratie van een gewricht wordt een naald in het gewricht geplaatst. Dit wordt eventueel gedaan onder röntgendoorlichting of echogeleide.

In deze folder vindt u informatie over de behandeling, hoe u zich moet voorbereiden en wat u kunt verwachten.

Voor de behandeling

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, wilt u vóór de behandeling dan contact opnemen met uw behandelend arts:

- U bent mogelijk zwanger
- U heeft suikerziekte
- U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters
- U gebruikt bloedverdünnende medicijnen

Dag van de behandeling

De behandeling vindt plaats op de pijnpoli. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. Uw begeleider mag wachten in de wachtruimte en kan helaas niet bij uw behandeling aanwezig zijn. Ons advies is de rest van de dag vrij te plannen.

De behandeling

We helpen u eerst in de juiste houding, zodat de pijnspecialist u goed kan behandelen. U gaat liggen of zitten. Vervolgens plaatst de pijnspecialist de naald op de juiste plaats in het gewricht en wordt de medicatie ingespoten. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds verwijderen. U kunt de volgende dag weer douchen.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt minimaal een half uur tot een uur inclusief voorbereiding en nacontroles.

Na de behandeling

- Na de behandeling blijft u nog even bij ons ter observatie. U krijgt na enkele controles een vervolgspraak mee.
- Door de medicatie die u ingespoten heeft gekregen, mag u niet autorijden of alleen naar huis. U moet daarom een begeleider meenemen naar de afspraak of iemand vragen u na de behandeling op te halen. Zonder begeleider, kunnen wij de behandeling helaas niet uitvoeren.
- De eerste 2 weken na de behandeling kan een tijdelijke verergering van de pijnklachten optreden. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na 4 tot 8 weken kan het resultaat van de behandeling goed worden beoordeeld. Het is ook mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Complicaties of bijwerkingen

Het infiltreren van een gewricht is een veilige behandeling en verloopt meestal zonder problemen. De pijnspecialist overlegt met u of de behandeling in uw geval mogelijk bijzondere risico's met zich mee kan brengen.

Na de infiltratie van een gewricht kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

- Als een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeding ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn, maar gaat vanzelf weer over.
- Door het ontstekingsremmende medicijn kunnen opvliegers optreden (bij zowel mannen als vrouwen), de menstruatie kan verstoord worden en de anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar. Daarnaast kunnen bij suikerpatiënten de bloedsuikerwaarden iets schommelen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de behandeling, neem dan contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk.
Laat daarom uw waardering achter
op ZorgkaartNederland.nl!



Wilt u een
waardering
achterlaten?



DC Klinieken