

Blokkade ganglion sfenopalatinum



Patiënteninformatie

Bij sommige soorten hoofd- en aangezichtspijn kan een zenuwknoop achter de neus verantwoordelijk zijn voor de klachten. Deze structuur, het ganglion sfenopalatinum, kan geïrriteerd raken en heftige pijn geven. Deze pijnklachten zijn te verhelpen door deze zenuwknoop te verwarmen en zo een aantal pijn vezels uit te schakelen. Ook kan er een ontstekingsremmende stof worden ingespoten. In deze brochure vindt u meer informatie over deze behandeling.

Voorzorgsmaatregelen

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u voor de behandeling contact op te nemen met uw behandelend arts:

- U bent mogelijk zwanger;
- U heeft suikerziekte;
- U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters;
- U gebruikt bloedverdünnende medicijnen.

De dag van de behandeling

U kunt zich melden bij de receptie. Zorg dat u op tijd aanwezig bent (minimaal tien minuten voor uw afspraak). Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Rekent u op een verblijf van minstens 2 uur, u dient de rest van de dag vrij te zijn.

De behandeling

We helpen u eerst om in de juiste houding te liggen. De huid wordt verdoofd en een dunne naald wordt in de wang geprikt. Wanneer de naald met behulp van een röntgenapparaat op de juiste plaats is geplaatst controleren we met stroompjes door de naald of de naald goed zit. Via de naald wordt na verdooving een warmtebeschadiging gemaakt, doordat de naaldpunt wordt verwarmd. Op deze wijze worden een aantal pijnvezels in de zenuwknoop uitgeschakeld. Soms wordt er na de warmtebehandeling een ontstekingsremmende stof ingespoten.

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Na de behandeling wordt u op een bed op de dagklinik gelegd en krijgt u na enige controles een vervolgspraak mee.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na enkele weken tot wel twee maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Complicaties/bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De behandeling van het ganglion sfenopalatinum leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De pijn specialist overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.



Na deze behandeling kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

- Tijdelijke hoofdpijn;
- Een neusbloeding;
- Bij vrouwen kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden; de anti conceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar!
- Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren;
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeding ontstaan in de wang ontstaan;
- Een verminderd gevoel in het verhemelte.

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken Dokkum

Patiënten van DC Klinieken Dokkum bellen in geval van spoed na pijnzorg, of maag- en darmonderzoek: 088 0100 960 of na radiologie: 088 0100 985.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Laat daarom uw waardering achter op ZorgkaartNederland.nl!



**Zorgkaart
Nederland**
Patiëntenfederatie Nederland

Wilt u een
waardering
achterlaten?



DC Klinieken