

Behandeling van het ganglion cervicale superior

PIJNZORG

Patiënteninformatie

Het ganglion cervicale superior loopt aan de voorzijde van de tweede en derde nekwerfel en kan verantwoordelijk zijn voor verschillende pijnklachten. Vooral bij diverse vormen van hoofden aangezichtspijn kan deze zenuw een rol spelen, maar ook bij nek-, schouder-, arm-en borstspijn. Eerst wordt het ganglion cervicale superior voor 4 tot 6 uur verdoofd om te kijken of uw pijn afneemt. Als blijkt dat uw pijnklachten duidelijk verbeteren dan kunnen we een definitieve behandeling uitvoeren door deze zenuw te verwarmen. Uw pijnklachten kunnen daardoor langdurig afnemen. In deze brochure vindt u meer informatie over deze behandeling.

Voorzorgsmaatregelen

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts vóór de behandeling:

- U bent mogelijk zwanger;
- U heeft suikerziekte;
- U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters;
- U gebruikt bloedverdünnende medicijnen.

De dag van de behandeling

U kunt zich melden bij de receptie. Zorg dat u op tijd aanwezig bent (minimaal tien minuten voor uw afspraak). Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Rekent u op een verblijf van minstens 1 uur, u dient de rest van de dag vrij te zijn.

De behandeling

U komt op een behandeltafel te liggen. Tijdens de behandeling gaat een dunne naald door de huid aan de zijkant van de nek. Als de naald op de juiste plaats is, wordt de zenuw geprikkeld. U voelt dan tintelingen aan de zijkant van de nek. We spuiten de verdovingsvloeistof in, waardoor deze zenuw tijdelijk wordt uitgeschakeld. Indien dit een duidelijk gunstig effect heeft op uw klachten, zal de procedure op een later tijdstip worden herhaald. Hierbij wordt deze zenuw met elektrische stroom behandeld. De pijnvezels worden daardoor langdurig geblokkeerd. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Na de behandeling wordt u op een bed op de dagklinik gelegd en krijgt u na enige controles een vervolgspraak mee.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na enkele weken tot wel 2 maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Complicaties/bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De behandeling van het ganglion cervicale superior leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.

Na een behandeling van het ganglion cervicale superior kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

- Een afhankelijk ooglid bij de proefbehandeling voor 4-6 uur;
- Een afhankelijk ooglid na de definitieve behandeling. Dit komt zeer zelden voor;
- Tijdelijk een doof gevoel van de huid op de plek van de behandeling;
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan.

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken Dokkum

Patiënten van DC Klinieken Dokkum bellen in geval van pijnzorg, of maag- en darmonderzoek: 088 0100 960 of na radiologie: 088 0100 985.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Laat daarom uw waardering achter op ZorgkaartNederland.nl!



Zorgkaart
Nederland

Patiëntenfederatie Nederland

Wilt u een
waardering
achterlaten?



DC Klinieken