

Ketamine-infuus

Patiënteninformatie

PIJNZORG

Bij veel pijnsyndromen kan een toestand ontstaan waarbij alle behandelingen hebben gefaald en zelfs hoge doseringen morfine-achtige middelen niet leiden tot een duidelijke pijnvermindering. Het gaat om een toestand van overprikkelbaarheid van het zenuwstelsel, ook wel bekend als wind-up.

Voor de behandeling

- Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent. De lokale pijnpoli bespreekt de tijden met u.
- Zorgt ervoor dat u op de dag van de behandeling makkelijk zittende kleding draagt.
- Drinken (koffie, thee) en een lichte lunch wordt verzorgd door de dagverpleging.

De behandeling

Ketanest-S wordt toegediend via een infuus op de dagbehandeling. Deze behandeling duurt de gehele dag. De behandeling kan gedurende de dag voor tijdelijke bijwerkingen zorgen. U hoeft niet nuchter te zijn en mag in de loop van de dag gewoon eten en drinken.

Het effect van de behandeling begint na enkele dagen en kan tot enkele maanden aanhouden. Indien deze behandeling een gunstig effect heeft op de pijn, zonder dat daarbij onacceptabele bijwerkingen optreden, kan de behandeling indien nodig herhaald worden. Het lijkt erop dat het herhalen van de behandeling zorgt voor een langer werkzaam effect.

Na de behandeling

U mag de rest van de dag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Complicaties/bijwerkingen

Bijwerkingen die tijdens en na de behandeling voor kunnen komen:

- dubbelzien;
- hallucinaties;
- dronken gevoel;
- snelle hartslag
- slaperigheid;
- hoge bloeddruk
- misselijkheid;
- duizeligheid.

Deze bijwerkingen zijn tijdelijk en komen vooral de eerste dagen voor. Ook kunnen bijwerkingen verdwijnen na verminderen of het stopzetten van de behandeling. Bij misselijkheid en braken kunnen geneesmiddelen gegeven worden om dit tegen te gaan.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een infectie optreden op de plek waar de injectienaald heeft gezeten.

Neem direct contact met ons op als u last krijgt van:

- Lokale roodheid die erger wordt
- Lokale zwelling die erger wordt
- Koorts (hoger dan 38 graden)

Resultaat

Vier weken na de behandeling wordt u gebeld door de verpleegkundige van de pijnpoli. Bij het telefonisch consult wordt het resultaat van de behandeling geëvalueerd en het vervolgbeleid bepaald. Houd voor uzelf bij wat de pijnscore is geweest in de eerste twee weken na de behandeling. Eventuele vragen kunt u opschrijven om tijdens het telefonisch consult te bespreken.

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken Dokkum

Patiënten van DC Klinieken Dokkum bellen in geval van spoed na pijnzorg, of maag- en darmonderzoek: 088 0100 960 of na radiologie: 088 0100 985.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Laat daarom uw waardering achter op ZorgkaartNederland.nl!



Wilt u een
waardering
achterlaten?