

Ambulante flebectomie volgens Muller

Dermatologie

Spataderen kunnen worden behandeld door een operatie, sclerocompressietherapie, foam echosclerose, Muller-techniek (ambulante flebectomie) en de closurebehandeling (VNUS). Op advies van uw behandelend specialist wordt één of een combinatie van deze behandelingen bij u uitgevoerd. In deze folder wordt ambulante flebectomie volgens Muller besproken.

Wat is ambulante flebectomie volgens Muller?

Bij u zijn spataderen geconstateerd die vanwege hun formaat het beste kunnen worden behandeld met de Muller-methode. Bij deze techniek, vernoemd naar de dermatoloog Muller, worden de spataderen onder lokale verdoving via kleine sneetjes (incisies) weggehaald. U houdt aan deze behandeling geen of een klein litteken over.

De behandeling

De ingreep vindt plaats bij DC Klinieken, op de afdeling dermatologie. Zodra u in de behandelkamer bent, vraagt de assistent u te blijven staan. Zo worden de spataderen door de druk goed zichtbaar. De dermatoloog tekent het te behandelen gebied af met een huidstift. U mag plaatsnemen op de behandeltafel, vervolgens krijgt u enkele prikken met de verdovingsvloeistof Lidocaïne die uw huid plaatselijk verdooft. Deze prikken kunnen wat branderig aanvoelen. Het te behandelen gebied wordt daarna gedesinfecteerd.

De ingreep gebeurt steriel, dit betekent dat uw been bedekt wordt met steriele doeken. De dermatoloog maakt kleine sneetjes van ongeveer 1-2 mm, waarna de dermatoloog de spatader verwijdt. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten. Als deze klaar is, maakt de assistent uw been schoon, op de sneetjes worden hechtpleisters geplakt en er wordt een drukverband aangelegd. De assistent doet samen met u de steunkous aan. Wij vragen u na de ingreep nog een half uur plaats te nemen in onze wachtruimte vanwege een eventuele nabloeding.

Voorbereiding

- Als u bloedverduunners gebruikt, wilt u dit dan tijdig aan ons doorgeven?
- Mocht u allergisch zijn voor verdovingsvloeistoffen, desinfectiemiddelen of pleisters, laat dit dan aan ons weten.
- Neem uw steunkous mee naar de afspraak.
- Wij adviseren u een ruim zittende broek en schoenen te dragen.
- Gebruik geen bodylotion of andere producten op uw benen.
- Wij vragen u twee dagen van te voren uw been te scheren.
- Neem iemand mee die u naar huis kan brengen.

Na de behandeling

- De steunkous die u heeft aangekregen, houdt u de eerste twee dagen aan (dag en nacht), daarna gedurende minimaal twee weken alleen overdag.

- Trek na het douchen de steunkous weer aan.
- De hechtpleisters laat u een week zitten, deze mogen nat worden.
- Het is normaal als u op uw been bloedingen heeft, deze verdwijnen na 3 tot 6 weken vanzelf.
- Na de ingreep mag u de eerste 24 uur niet autorijden.
- Na de ingreep mag u in de eerste week niet intensief sporten.
- Uw dagelijkse bezigheden kunt u direct na de ingreep hervatten.

Bijwerkingen

- Bij een ingreep in de knieholte kan er door een bloeding tijdelijk een doof gevoel in het been ontstaan. Dit gebeurt zelden en het trekt binnen 1 tot 2 dagen weg.
- Zeer zelden wordt een klein zenuwtakje beschadigd bij het verwijderen van een spatader, hierdoor kan het gevoel (pijn en tast) in het gebied eronder verminderd of verdwenen zijn. Ook dit herstelt zich meestal volledig, maar dat kan enkele maanden duren. Grote en belangrijke zenuwen die spieren aansturen worden nooit beschadigd bij een Muller-procedure, deze zenuwen bevinden zich allemaal veilig in de diepte.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een infectie optreden. Neem direct contact met ons op als u rondom de plaats van de behandeling last krijgt van toenemende:

- Pijn
- Roodheid
- Zwelling
- Koorts (hoger dan 38 graden)

Wanneer dient u een arts te waarschuwen?

Neem direct contact op bij:

- koorts (boven de 38 graden);
- pussende wondjes;
- een warm, rood en/of dik (onder)been.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.