

CT-onderzoek van de bloedvaten

Radiologie

Binnenkort komt u voor een CT-onderzoek naar DC Klinieken Dokkum. Uw behandelend arts heeft dit onderzoek voor u aangevraagd. Graag geven we u informatie over de voorbereiding op dit onderzoek en over het onderzoek zelf.

Vorbereiding thuis

Omdat u een contrastvloeistofinjectie krijgt, mag u vanaf drie uur voor het geplande tijdstip van het onderzoek niet meer eten en drinken. Medicijnen mag u nog wel innemen, het liefst met water of melk. Het is belangrijk dat u medicijnen niet met koolzuurhoudende dranken inneemt, zoals sinas en cola.

Wanneer u nierfalen, astma of een allergie heeft, verzoeken wij u dit vooraf aan een van de medewerkers van de röntgenafdeling door te geven. Dit is belangrijk in verband met de contrastvloeistof.

Diabetespatiënten (suikerziekte)

Gebruikt u het medicijn Metformine (Glucophage)? Breng ons hier minimaal drie dagen vóór het onderzoek van op de hoogte via 088 0100 985.

Het onderzoek

Bij Computer Tomografie, beter bekend als een CT-scan, ligt u op een tafel die in een soort ring wordt geschoven. In deze ring bevindt zich een ronddraaiende röntgenbuis. Met behulp van een computer kunnen zo dwarsdoorsneden van het lichaam in beeld worden gebracht. Op die manier verkrijgen we een goed ruimtelijk overzicht van de gescande organen.

Via een infuusnaald krijgt u de contrastvloeistof toegediend. Gedurende de scan schuift de tafel langzaam door de ring, terwijl u rustig blijft liggen. Het toestel maakt soms een zoemend geluid. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 - 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt binnen 24 uur verstuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Hij of zij zal u verder informeren.

Zwangerschap/borstvoeding

Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan van tevoren contact op met de afdeling Radiologie. Weet u niet zeker of u zwanger bent, dan is het belangrijk dat het onderzoek in de eerste tien dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvindt. Zwangerschap is dan zeer onwaarschijnlijk.

Als u borstvoeding geeft en u krijgt een contrastinjectie tijdens het onderzoek, dan adviseren wij u om tot 24 uur na de injectie geen borstvoeding te geven.

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken Dokkum

Bel in geval van spoed: 088 0100 985.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.